


คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



เขตสุขภาพที่ ๖
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ ๖

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์

นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช

นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง

นายแพทย์ฉัตรชัย สวัสดิไชย

นายแพทย์รุ่งวิทย์ เहरาบัตย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จัดพิมพ์และรวบรวมโดย

งานแพทย์แผนไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์ ๐๓๗ ๒๑๑ ๖๒๖ ต่อ ๑๔๓

พิมพ์ครั้งที่ ๓

เดือนกันยายน ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

จำนวน

๒,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่

ช.ดำรงชัยการพิมพ์

ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๔ ๑๓๖๐

งบประมาณ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๖ กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนโดยการจัดระบบสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ มีการจัดระบบบริการสุขภาพออกเป็นหลายระดับได้แก่ บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) บริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) โดยมุ่งหวังให้บริการแต่ละระดับมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อกันด้วยระบบส่งต่อ (Referral)

สถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศไทย พบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตวายและอื่น ๆ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, stroke) หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็น ซึ่งโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศองค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) รายงานสาเหตุการจากตายโรคหลอดเลือดสมอง อันดับ ๒ ของประชากรอายุมากกว่า ๖๐ ปี ทั่วโลกและเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ ๕ ของประชากรอายุมากกว่า ๑๕ – ๕๙ ปี และในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ ๖ ล้านคน ซึ่งมากกว่าคนทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วัณโรค และโรคมalaria รวมกัน โรคหลอดเลือดสมองหากเป็นแล้วก่อให้เกิดความพิการและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง รวมค่าเสียโอกาสจากการขาดงานและความพิการ

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ **แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก** ขึ้น สำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทยในการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในชุมชน

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและจัดพิมพ์คู่มือ และขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๖ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้จัดทำ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

สารบัญ

	หน้า
	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	๑
บทที่ ๑	๑
บทนำ	๑
ความเป็นมา	๑
วัตถุประสงค์การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย	๑
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ด้วยการแพทย์แผนไทยและ	
การแพทย์ทางเลือก	
ขอบเขตและบทบาทหน้าที่การให้บริการแพทย์แผนไทยร่วมกับ	๑
ทีมหมอครอบครัว	
บทบาทของแพทย์แผนไทยในระบบบริการปฐมภูมิ / ชุมชน	๒
และทีมหมอครอบครัว	
บทที่ ๒	๓
ทฤษฎีโรคหลอดเลือดสมอง	๓
ความหมาย	๓
ประเภทโรคหลอดเลือดสมอง	๓
คำนิยามแพทย์แผนไทย	๓
กลไกการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย	๖
อาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการจำแนกประเภท	๗
ผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่อง	
บทที่ ๓	๘
กระบวนการงานเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	๘
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
Flow chart แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย	๘
โรคลมอัมพฤกษ์ ลมอัมพาต ตามแนวทางเวชปฏิบัติของ	
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
Flow Chart การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)	๙
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ ๖	
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม Flow Chart กระบวนการงานเวชปฏิบัติ	๑๐
การคัดกรองผู้ป่วย	๑๐
การปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน	๑๐

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ ๓	
การตรวจประเมิน	๑๑
การวางแผนการฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย	๑๑
แนวทางการรักษาด้วยการนวดไทย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองในชุมชน	๑๓
ระยะเวลาการนวดและความถี่	๑๗
คำแนะนำหลังนวด	๑๗
ข้อควรระวังในการนวด	๑๘
ข้อควรระวังตามแนวทางการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด	๑๘
แนะนำยาสมุนไพร	๑๘
ยาสมุนไพรที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	๒๐
การให้คำแนะนำ	๒๓
การประเมินผลหลังการฟื้นฟูสภาพ	๒๓
การวางแผนจำหน่าย	๒๓
การประเมินประสิทธิผลระบบการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองของทีมหมอครอบครัวระดับปฐมภูมิ	๒๓
เอกสารอ้างอิง	๒๔
ภาคผนวก	
การจำแนกประเภทผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วไปที่ต้องดูแลต่อเนื่อง	๒๖
แบบบันทึกประวัติ ปัญหา การวินิจฉัยโรค และการวางแผน การรักษา ผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน	๒๗
แบบบันทึกการการรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วยรายวัน ของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในชุมชน (ใช้สำหรับการบันทึก รายวัน)	๒๘
แบบประเมินการติดตามการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองในชุมชน	๒๙
แบบสรุปการให้คัดกรองผู้ป่วยหลอดเลือดสมองทาง การแพทย์แผนไทยในชุมชน	๓๐
คำอธิบายแบบบันทึก	๓๑

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	
แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย	๓๓
โรคหลอดเลือดสมอง (Barthel Index)	
แบบประเมิน Motor power ในผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง	๓๔
ระดับ INR ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม	๓๖
รหัสวินิจฉัยโรค รหัสหัตถการ (ในระบบฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม)	๓๖
ด้านการแพทย์แผนไทย	
รายนามผู้จัดทำ	๓๗

บทที่ ๑

บทนำ

ความเป็นมา

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเป็นสาขาที่ ๑๒ ของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ (Service plan) แนวทางการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปี ๒๕๕๙ ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีเป้าประสงค์เพื่อ ๑) การนำการแพทย์แผนไทยที่โดดเด่นและมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนมาใช้ร่วมกับดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันและทีมสหวิชาชีพ (Comprehensive approach) ๒) การลดช่องว่าง (Gap) ระหว่างแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับแพทย์แผนปัจจุบัน ๓) การร่วมปรึกษาหารือการดูแลผู้ป่วย (Consultation) โดยมีมาตรการ ๑) การจัดตั้งคณะกรรมการ Service plan ทุกระดับ ๒) การจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทย ๓ ระดับ พร้อมจัดทำคู่มือ (ระดับ ๑ Advance level ระดับ ๒ Intermediate level ระดับ ๓ Basic level) ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดบริการแบบผสมผสาน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโดยเน้นปัญหาของผู้ป่วยเป็นตัวตั้ง ๔) พัฒนารูปแบบคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพหลัก Service plan การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของเขตสุขภาพที่ ๖ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเพื่อพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยจากทั้ง ๘ จังหวัดของเขตสุขภาพที่ ๖

วัตถุประสงค์การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีมาตรฐานเดียวกัน

๒. เพื่อให้มีแนวทางการบูรณาการบริการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกับระบบการดูแลผู้ป่วยแผนปัจจุบัน

๓. เพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนของทีมหมอครอบครัวระดับปฐมภูมิ

ขอบเขตและบทบาทหน้าที่การให้บริการแพทย์แผนไทยร่วมกับทีมหมอครอบครัว

ขอบเขตการให้บริการแพทย์แผนไทย

๑. ดำเนินการเชิงรุก โดยจัดให้มีบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งจัดการปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของการป้องกันสุขภาพ เช่น การจัดให้มีการสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทย การจัดบริการนวด อบ ประคบ

สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน การฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอดด้วยการทักหม้อเกลือ เป็นต้น

๒. บริการต่อเนื่อง สามารถให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา สามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาได้ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดบริการแพทย์แผนไทยในชุมชนแก่ทีมสุขภาพอื่นๆ เช่นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อสม. หมอพื้นบ้าน เป็นต้น

๓. ความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งด้านระบบข้อมูลและระบบส่งต่อ-ส่งกลับ การเชื่อมโยงการจัดการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ระบบดูแลผู้ป่วยในชุมชน (Home ward) รวมทั้งมีการเชื่อมโยงงานการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข หมอพื้นบ้าน เป็นต้น

บทบาทของแพทย์แผนไทยในบริการปฐมภูมิ / ชุมชน และทีมหมอครอบครัว

แพทย์แผนไทยร่วมเป็นทีมหมอครอบครัว ให้การรักษาพยาบาลตามหลักการแพทย์แผนไทย ดังนี้

๑. ตรวจ วินิจฉัย สั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยตามแนวทางเวชปฏิบัติของแต่ละโรค
๒. ให้บริการแพทย์แผนไทยครอบคลุม ๔ มิติ เน้นการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามแนวทางเวชปฏิบัติ
๓. ร่วมจัดระบบรับและส่งต่อผู้ป่วยและสื่อสารกับ Case manager ในผู้ป่วยตามกลุ่มโรค
๔. การควบคุม กำกับ สนับสนุนการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ผู้ช่วยนวด) ด้านการนวด ในรพ.สต.และสนับสนุนวิชาการบุคลากรอื่นๆ
๕. ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการให้บริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๖.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย / อสม. หรือจิตอาสาในชุมชน เช่น ด้านโภชนาการ / การยืดเหยียดร่างกาย (ออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน) / สมาธิบำบัดและการจัดสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๗. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลและความปลอดภัย (ความเสี่ยง) จากการรักษา เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวด ประคบสมุนไพร และการให้คำแนะนำ
๘. บันทึกผลการให้บริการ และรายงานข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยให้กับศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
๙. จัดทำตัวชี้วัดร่วมกับทีมหมอครอบครัว โดยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริการแพทย์แผนไทย

บทที่ ๒

ทฤษฎีโรคหลอดเลือดสมอง

ความหมาย

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นการหยุดการทำงานของสมองอย่างฉับพลันโดยมีสาเหตุจากการรบกวนหลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง โรคนี้อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ของสมอง (ischemia) ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด (thrombosis) หรือภาวะมีสิ่งหลุดอุดตันหลอดเลือด (embolism) หรืออาจเกิดจากการตกเลือด (hemorrhage) ในสมอง ผลจากภาวะดังกล่าวทำให้สมองส่วนที่ขาดเลือดหรือตกเลือดทำงานไม่ได้ และอาจส่งผลทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีก (hemiplegia; ไม่สามารถขยับแขนขาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือซีกใดซีกหนึ่ง) ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจหรือพูดได้ หรือตาบอดครึ่งซีก (hemianopsia ; ไม่สามารถมองเห็นครึ่งซีกหนึ่งของลานสายตา) ทั้งนี้ถ้ามีความรุนแรงมาก อาจทำให้ถึงตายได้

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง

อัมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สมองขาดเลือด พบประมาณ ๗๐ – ๘๐ % ของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรืออุดตัน ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง การสูบบุหรี่ ภาวะหัวใจวายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด การขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โรคเลือดบางอย่าง เช่น ภาวะเลือดข้นผิดปกติ เกร็ดเลือดสูง เม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่เป็นเวลานานจะเป็นผลให้ผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัว เกิดการตีบหรืออุดตัน ทำให้สมองขาดเลือดเกิดอัมพาตตามมาในที่สุด โดยผู้ป่วยเหล่านี้มักมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมด้วย

๒. หลอดเลือดสมองแตก เมื่อเกิดการแตกของหลอดเลือดสมอง ก้อนเลือดจะเบียดดันเนื้อสมองส่วนที่ดีทำให้เสียหายที่เซลล์สมองทำงานผิดปกติ เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตตามมา ภาวะนี้มักสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาอยู่เป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังเกิดจากความเครียด การดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาบางชนิด

คำนิยามแพทย์แผนไทย

อัมพฤกษ์ (Paresis) อัมพาต (Paralysis) เป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตก หรือเกิดจากสมองไขสันหลัง หรือเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ หรือมีการอักเสบ เป็นต้น ในทางการแพทย์แผนไทยได้มีการระบุสมุฏฐานไว้ว่า เกิดจากลมอโรคะมาวาตา และลมอุทังคะมาวาตา พัดระคนกัน (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, ๒๕๔๒ : ๒๔๔๖)

อัมพฤกษ์ หมายถึง ภาวะที่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้บางส่วน ทำให้เคลื่อนไหวได้ไม่ตรงตามทิศทางที่ต้องการ / เป็นข้อเส้นซึ่งเป็นศูนย์กลางของร่างกายอยู่ด้านหน้าท้อง (ต่ำกว่าสะดือ) / อาการที่อวัยวะบางส่วน เช่น แขน ขาอ่อนแรง

อัมพาต หมายถึง ภาวะที่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เลย ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ / อาการกล้ามเนื้อเสื่อม หรือเสียหายที่ไปเนื่องจากโรคของระบบประสาท (ระบบลม) หรือโรคของกล้ามเนื้อ (ปฏิก) / อาการที่อวัยวะบางส่วน เช่น แขน ขาตายไป เคลื่อนไหวไม่ได้

ทั้งกรณีอัมพาต และอัมพาตอาจมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือไม่มีแรง อ่อนเหลวหรือแข็งเกร็ง และอาจสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่ร่างกายบางส่วนหรือไม่มีความรู้สึกเลย ตาอาจปิดไม่สนิท ปากเปี้ยวพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้

ลมอัมพาต หมายถึง ลมที่ทำให้เกิดอาการเคลื่อนไหวไม่ได้ โดยกระดูกไม่เคลื่อนไหว

ลมอัมพาต หมายถึง ลมที่ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ และมีอาการกระดูกเคลื่อนไหว ลมจับเอากันกบไปถึง ร้าวข้าง จับเอาหัวใจ แล้วให้ซึมมัน แล้วขึ้นไปร้าวข้างขึ้นไปจับเอาต้นลิ้น เจริญไม่ได้ขัดแลมและเส้นที่เกี่ยวข้องกับลมอัมพาตอัมพาต

๑. ลมอโรคมาวาตา เปรียบเทียบได้กับระบบประสาทสั่งการ เริ่มตั้งแต่สมอง ทำให้มีการเคลื่อนไหวตามต้องการ อยู่ในอำนาจจิตใจ เป็นลมที่พัดจากศีรษะถึงปลายเท้า

ลมอโรคมาวาตาพิการ คือ ลมอโรคมาวาตาเกิดการสูญเสียหน้าที่ จะส่งผลให้ยกมือ ยกเท้าไม่ได้ ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก แต่ในส่วนของการรับรู้ความรู้สึกไม่ได้เสียไปด้วย จึงเกิดความเจ็บปวด

๒. ลมอุทังคมาวาตา เปรียบเทียบได้กับระบบประสาทรับรู้ความรู้สึก เป็นลมที่พัดจากปลายเท้าถึงศีรษะ อนุมานได้ว่าลมนี้เป็นพลังประสาทรับรู้ความรู้สึกทุกชนิด ทั้งอวัยวะภายนอกและภายใน เป็นระบบงานแบบอัตโนมัติในอำนาจจิตใจ เช่น เมื่อนี้ถูกความร้อน ก็จะมีการหดมือกลับอัตโนมัติ

ลมอุทังคมาวาตาพิการ คือ ลมอุทังคมาวาตาเกิดการสูญเสียหน้าที่ จะส่งผลให้ปลายประสาททางตา หู จมูก ลิ้น บริเวณศีรษะและคอ ทูรนทูราย ดิ้นรน มือเท้าชาชักไขว่ หาวเรอบ่อยๆ (เป็นอาการของการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้อยู่ในอำนาจของจิตใจ)

๓. ลมหทัยวาตะ เป็นลมประจำหัวใจ (หัวใจ) เป็นลมที่ทำให้หัวใจบีบตัว คลายตัว เมื่อคลายตัวแล้วลมที่ออกพ้นหัวใจไปแล้ว ก็จะเรียกตามเส้นที่ลมวิ่งไป

๔. ลมสุมนา เป็นลมประจำเส้นสุมนา จะวิ่งอยู่แนวกลางลำตัว หากลมไม่พัดหรือไม่ทำงานตามปกติ ก็จะก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า ลิ้นแข็ง ปากเปี้ยว ลมสุมนา ถ้าบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใด กระทำให้อดอันไปทั้งกาย มีรู้สึกตัว และลมกองนี้เกิดแต่ลมอัมพาต มักเกิดขึ้นในระหว่างตรีโทษ กระทำให้โสตรประสาท (หู) มีได้ยินศัพท์สำเนียงอันใด ให้จักขุประสาท (ตา) มีได้เห็นสิ่งใดชัด ให้ฆานประสาท (จมูก) มีได้กลิ่นอันใด ให้ชีวหาประสาท (ลิ้น) มีได้รู้จักรสอันใด ให้กายประสาท (กาย) มีได้รู้สึกสัมผัสอันใด ลมสุมนาเกิดในระหว่างตรีโทษถึงมรณันติขณะ เป็นที่สุดแห่งโรค เยียวยามิได้เลย ถ้าจะแก้ให้แก้แต่พอได้ความสุข ให้เวทนานั้นน้อยลง

๕. เส้นสุมนา เป็นเส้นสมมุติในเส้นประธานสิบ มีจุดเริ่มต้นเหนือสะดือประมาณ ๒ นิ้วมือ แล่นลึกไปแนวกระดูกสันหลังตรงไปยังหัวใจ ผ่านลำคอไปจรดโคนลิ้น เส้นสุมนามีความสัมพันธ์กับระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาทและสมองเส้นสุมนาพิการเนื่องจากโลหิตที่ฉีดออกจากหัวใจเดินไปตามหลอดเส้นนั้นขัดข้อง เพราะตีบหรือเป็นเมล็ดขึ้นในเส้น โลหิตที่เดินตามเส้นเดินไม่สะดวก จึงเกิดพิการขึ้น มีผลทำให้เกิดอาการพูดไม่ออก เกิดลมที่เรียกว่าชีวหาสคมภ เกิดลิ้นกระด้างคางแข็ง หนักอก หนักใจ เชื่อมมัว เกิดการจุกอก พูดจาเพ้อ เบื่ออาหาร มืออ่อนแรงหรือเกิดจากเส้นสุมนาถูกเส้นอิทาและเส้นปิงคลาเบียด บีบ หรือทับเส้นสุมนานั้น เมื่อโลหิตออกจากหัวใจตกมาถึงเส้นนั้นก็เดินไม่สะดวก จึงเกิดเป็นพิษ พิษนั้นก็กลับเข้าไปทำให้หัวใจพิการ ทำให้เกิดโรคอันร้ายแรงต่างๆ เช่น ลมมีพิษ ๖ จำพวก คือ ลมราทยักษ์ ลมกุมภณชยักษ์ ลมบาทจิตต์ ลมพุทธรักษ์ ลมอคมุขี ลมอินทรธนู (ในคัมภีร์ขวดารกล่าวถึงลมมีพิษ ๖ จำพวกนี้ว่า เยียวยายากนัก เป็นปัจฉิมที่สุดโรค ให้พิจารณาดูทางทวารหนัก ทวารเบา ถ้ายังอุ้งอยู่ให้แก้ต่อไป ประการหนึ่งให้ดูผิวหนัง นิ้วมือตกลง

แล้วยกขึ้นดูหาโลหิตมิได้ รอยนิ้วกดแล้วยกขึ้นเป็นรอยเขียวช้ำ เป็นอาการตัดแล (อาการหนักมาก อาจอันตรายถึงชีวิต) เมื่อแก้หายแล้วบางครั้งกลายเป็นอัมพาตไป และยังให้มีอาการร้ายแรงอีกหลายอย่าง

๖. เส้นอิทา เป็นเส้นสมมุติในเส้นประธานสิบ มีจุดเริ่มต้นห่างจากสะดือข้างซ้ายประมาณ ๑ นิ้วมือ แล่นลงไปบริเวณหัวเหน่าผ่านต้นขาซ้ายด้านในไปยังหัวเข่า แล้ววกกลับมาอยู่ที่ต้นขาด้านนอกผ่านกลางแก้มก้นมาตามกระดูกสันหลังข้างซ้ายถึงต้นคอ ไปบนศีรษะแล้ววกกลับมาผ่านหน้าผากมาจรดที่จมูกซ้าย เส้นอิทา มีความสัมพันธ์กับระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาทและสมองด้านซ้าย

๗. เส้นปิงคลา เป็นเส้นสมมุติในเส้นประธานสิบ มีจุดเริ่มต้นห่างจากสะดือข้างขวาประมาณ ๑ นิ้วมือ แล่นลงไปบริเวณหัวเหน่าผ่านต้นขาขวาด้านในไปยังหัวเข่า แล้ววกกลับมาที่ต้นขาด้านนอกผ่านกลางแก้มก้นมาตามกระดูกสันหลังข้างขวาถึงต้นคอ ไปบนศีรษะแล้ววกกลับมาผ่านหน้าผากมาจรดที่จมูกขวา เส้นปิงคลา มีความสัมพันธ์กับระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาทและสมองด้านขวา

โดยสามารถแบ่งลักษณะอาการโรคอัมพาตทางแขนขาได้ ๕ ชนิด คือ

๑. อัมพาตเฉพาะแขน เป็นโรคที่ทำให้แขนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง ๒ ข้างเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ เกิดจากเส้นประสาทระดับไขสันหลังช่วงต้นคอไม่เก็นกึ่งกลางสะบกผิดปกติ ซึ่งอาจจะมีจากสาเหตุพยาธิตัวจี๊ดเคลื่อนผ่าน เนื้องอกบริเวณไขสันหลังเบียดทับเส้นประสาท พบในเด็กจากการคลอด อุบัติเหตุ รถชน ตกจากที่สูง

๒. อัมพาตเฉพาะขา เป็นโรคที่ทำให้ขาข้างใดข้างหนึ่งเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ เกิดจากเส้นประสาทไขสันหลังช่วงเอว ก้นกดผิดปกติ เช่น เนื้องอก พยาธิตัวจี๊ดเคลื่อนผ่าน อุบัติเหตุบริเวณก้นกด

๓. อัมพาตครึ่งท่อน เป็นโรคที่ทำให้ขาทั้ง ๒ ข้าง เคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ มีปัญหาสูญเสียการควบคุมระบบการขับถ่าย อุจจาระ และปัสสาวะ เกิดจากเส้นประสาทระดับไขสันหลังช่วงต่ำกว่ากึ่งกลางสะบกผิดปกติ เช่น จากเนื้องอกบริเวณกระดูกสันหลัง เส้นเลือดสันหลังโป่งพองหรืออุบัติเหตุต่างๆ

๔. อัมพาตทั้งตัว เป็นโรคที่ทำให้แขนทั้ง ๒ ข้าง ขา ๒ ข้าง เคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ มีปัญหาควบคุมอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ สาเหตุจากระบบไขสันหลังบริเวณต้นคอเหนือกึ่งกลางปีกสะบกขึ้นไป เกิดจากอุบัติเหตุรถชน ตกจากที่สูง หรืออาจพบจากระบบสมองก็ได้ ซึ่งมักจะมีอาการพูดไม่ได้

๕. อัมพาตครึ่งซีก พบได้บ่อยที่สุดเป็นโรคที่แขนและขาข้างเดียวกันซีกใดซีกหนึ่งเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ เกิดจากระบบสมองด้านตรงข้ามกับร่างกายซีกที่เป็นอัมพาต เกิดจากเส้นเลือดมีการตีบ แตก อุดตัน มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ ไขมันในเส้นเลือด กรรมพันธุ์ พยาธิตัวจี๊ดเคลื่อนผ่าน เนื้องอกในสมอง ประสบอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมทำให้เกิดโรค ได้แก่ การพักผ่อนไม่เพียงพอ และการขาดการออกกำลังกาย

๕.๑ อัมพาตครึ่งซีก ชนิดอ่อน คือ อาการในระยะแรกของการเป็นอัมพาตกล้ามเนื้อแขนขา มีอาการอ่อนเหลวไม่มีกำลัง

อาการนำ

๑. แขนขา ขา และอ่อนแรงครึ่งซีก
๒. ปวดศีรษะรุนแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
๓. พูดลิ้นคับปาก
๔. ตาบอดชั่วขณะ

อาการแสดง

๑. มือเท้าตาย แขน ขา ไขว่คว้า (อาจจะขยับไม่ได้เลยหรือได้บ้าง แต่ควบคุมทิศทางแรงไม่ได้ ไม่มีกำลัง)
๒. ถ้าเดินได้ขาข้างดีจะก้าวสั้น ขาข้างที่เป็นจะเดินเหียงปิดปลายเท้า
๓. มือและแขนอ่อนปวกเปียก
๔. ข้อต่อหลุดหลวม โดยสังเกตได้ง่ายที่ข้อไหล่

๕.๒ อัมพาตครึ่งซีก ชนิดแข็ง คือ อาการในระยะต่อมาของการเป็นอัมพาตชนิดอ่อน

กล้ามเนื้อแขน ขามีอาการอ่อนเหลวไม่มีกำลัง ต่อมากลิ้นเนื้อมือ แขน ขา จะแข็งเกร็ง

อาการนำ

๑. แขนขา ชา และอ่อนแรงครึ่งซีก
๒. เดินเซ
๓. ปวดศีรษะรุนแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
๔. พูดลิ้นคับปาก
๕. ตาบอดชั่วคราว

อาการแสดง

อัมพาตชนิดแข็ง คือ อาการในระยะต่อมาของการเป็นอัมพาตชนิดอ่อน (กล้ามเนื้อแขน ขามีอาการอ่อนเหลวไม่มีกำลัง)

๑. มือเท้าตาย แขน ขา ไขว่คว้า (ขยับได้บ้าง แต่ควบคุมทิศทางแรงไม่ได้ ไม่มีกำลัง)
๒. ถ้าเดินได้ขาข้างดีจะก้าวสั้น ขาข้างที่เป็นจะเดินเหียงปิดปลายเท้า
๓. ระยะอัมพาตชนิดแข็งกล้ามเนื้อ มือและแขน จะแข็งเกร็ง หักงอ

กลไกการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

โรคลมอัมพฤกษ์หรือลมอัมพาต เกิดจากลมคือลมเบื้องสูง (ลมอุทอังคมาวาตา คือลมพัดขึ้นเบื้องบนจากเหนือสะดือ ถึง ศีรษะ) และลมเบื้องต่ำ (ลมอโรคมาวาตา คือลมพัดลงเบื้องล่าง ตั้งแต่ใต้สะดือ ถึงปลายเท้า) พัดระคนกัน จนเกิดโทษลมทั้งสองนี้เมื่อระคนกัน คือ ลมอโรคมาวาตา พัดย้อนขึ้นไประคนกับลมอุทอังคมาวาตา หรือลมอุทอังคมาวาตาทกลับพัดลงมาหาอโรคมาวาตา จึงเป็นเหตุให้โลหิตถูกพัดเป็นฟองและร้อนดังไฟ ส่วนลมในทิศเบื้องต่ำ คือลมอัมพฤกษ์และลมอัมพาต เกิดแต่ปลายเท้าถึงเบื้องบน ลมทั้งสองนี้ เป็นที่ตั้งแห่งฐานลมทั้งหลาย เมื่อระคนกันก็ให้หวาดหวั่นไปทั่ว เพราะไปกระทบกับ ลมหทัยวาตะ คือน้ำเลี้ยงหัวใจเมื่อลมระคนกันให้กำลังโลหิตแปรไป อาการที่ปรากฏจึงเป็นอาการทางระบบประสาท ให้จุดแน่น ชักมือกำ เท้างอ ดันไป ให้ลิ้นกระด้างคางแข็ง ขากรรไกรแข็ง เจรจาไม่ได้ บ้างสิ้นสติ หรือลมนี้มีกำลังขับโลหิต ให้คั่งเป็นวงเป็นสีตามร่างกาย (ตำราการแพทย์แผนไทยเดิม เล่ม ๑) ซึ่งมี ๒ สาเหตุดังนี้

๑. จากการบริโภคอาหารที่ไม่เคยบริโภคคือกินมากไป กินของดิบ เน่า บุด ของหยาบ กินน้อยเกินไป กินผิดเวลา กินเนื้อสัตว์มากเกินไป ซึ่งเป็นอาหารให้โทษรวม ๘ ประการ
๒. การกระทบร้อนกระทบเย็นมากเกินไป

อาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการจำแนกประเภทผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

อาการของโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยจะเกิดอาการชาหรืออ่อนแรงของแขนหรือขาครึ่งซีก เกิดการสับสน พูดไม่ออกหรือไม่เข้าใจคำพูด เกิดปัญหาการมองเห็น เกิดการง่วง เวียนศีรษะ เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หรือการซึมลง ลึนแข็ง พูดไม่ชัด เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อลึนและปากผิดปกติ เดินเซ ทรงตัวไม่อยู่ อาจเกิดร่วมกับอาการอ่อนแรง บางคนอาจหมดสติทันที ซึ่งการหมดสติ เกิดจากสมองเสียการทำงานไปมาก โดยเฉพาะบริเวณก้านสมอง หรือเกิดจากหลอดเลือดสมองแตกที่รุนแรง

การจำแนกประเภทผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่อง

- ประเภทที่ ๑ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่มีกำลังแขนหรือขาผิดปกติ
- ประเภทที่ ๒ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่มีกำลังแขนหรือขาสามารถยกได้ แต่ต้านแรงที่กดได้ น้อยกว่าปกติแขนหรือขาสามารถยกได้ แต่ต้านแรงที่กดไว้ไม่ได้ (เทียบ Motor power ๓ – ๔)
- ประเภทที่ ๓ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อไม่มีแรงหดตัวแต่ยกกล้ามเนื้อหดตัวได้ / มีการเคลื่อนไหวปลายนิ้วมือ - นิ้วเท้าได้เล็กน้อย กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต / แขนหรือขาไม่มีการเคลื่อนไหวเลย (เทียบ Motor power ๐ – ๒)
- ประเภทที่ ๔ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย


ประเภทผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ดูแลต่อเนื่องด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หมายถึง การดูแลผู้ป่วยอัมพาต ประเภทที่ ๒ และ ๓


บทที่ ๓

กระบวนการเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Flow Chart แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รมอัมพาต
ตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



Flow Chart การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ ๖



ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม Flow Chart

กระบวนการงานเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การคัดกรองผู้ป่วย (๑)

เกณฑ์คัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เพื่อดูแลต่อเนื่องด้วยการแพทย์แผนไทย

- ผู้ป่วยที่ยังมีอาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ลิ้นกระด้างคางแข็ง พูดไม่ชัด
- ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น
 - BP > ๑๖๐/๙๐ หรือ < ๙๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท
 - T > ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
 - มีอาการหอบ หายใจลำบาก หน้าซีดริมฝีปากเขียว หน้าเขียว ชัก
 - ชีพจร > ๑๐๐ หรือ < ๖๐ ครั้ง/นาที
- ผู้ป่วยที่รับประทานยา Warfarin ต้องไม่มีรอยฟกช้ำ ภาวะเลือดออกตามไรฟัน ถ่ายเป็นเลือด และมีค่า INR อยู่ในระดับปกติ

การปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน (๒)

เกณฑ์ปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน

- มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่กำลังเกิดขึ้น เช่น ความดันโลหิตสูงขึ้น มีอาการซึม อ่อนเพลีย จิตใจหดหู่ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ พูดไม่ชัดมากขึ้น เป็นต้น
- มีอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น ชัก อาเจียนพุ่ง ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ใช้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส หอบ หายใจลำบาก หน้าซีด ริมฝีปากเขียว หน้าเขียว ชีพจรเบา
- มีภาวะหอบหืดที่ต้องได้รับการรักษาด้วย Oxygen และ/หรือ พ่นยา
- มีอาการแน่นหน้าอก สงสัย Myocardial infarction (MI)

การตรวจประเมิน (๓)

เกณฑ์การตรวจประเมินทางการแพทย์แผนไทย	
เกณฑ์การตรวจประเมิน	เหตุผล
ลักษณะทั่วไป : ดูลักษณะที่ผู้ป่วย รูปร่าง สีผิวสังเกต อิริยาบถ การยืน เดิน นั่ง นอน การพลิกตัว การหยิบจับ สิ่งของ การกลืน การเคี้ยว การพูด การหลับตา การหายใจ	เพื่อประเมินธาตุปัจจุบันของผู้ป่วย (ปกติลักษณะ)
จับชีพจร : ที่ข้อมือและหลังเท้า ทั้ง ๒ ข้าง	เพื่อประเมินกำลังเลือดและลมของผู้ป่วย ทั้งลมเบื้องสูง ลมเบื้องต่ำ ดูระบบการไหลเวียนโลหิต ตรวจดูว่าวาตะ ปิตตะ เสมหะ มีการกำเริบ หย่อน พิการอย่างไร
การตรวจ : ดู ฟัง คลำ เคาะ ๑. ทดสอบความตึงแข็ง อ่อนนุ่ม และความร้อนเย็นของเส้น โดยการกด คลำ ๒. ทดสอบการรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย โดยการกด ลูบ สัมผัส	เพื่อประเมินว่ามีอาการแข็งตึงของท้องมากน้อยเพียงใด คลำดูภาวะลมอันในท้อง คลำดูความร้อนว่าสม่าเสมอหรือไม่ ฟังการเคลื่อนไหวของลำไส้ ประเมินภาวะท้องผูก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา ได้แก่ การตั้งตำรับยา และการนวดรักษา
ทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหว / กำลัง : ๑. ทดสอบการเคลื่อนไหวและกำลังของกล้ามเนื้อ ๒. การตรวจร่างกายทางหัตถเวชกรรมแผนไทย เช่น วัดสันเท้า ทดสอบแรงถีบปลายเท้า ๓. การวัดระดับความเจ็บปวดโดยใช้ Pain score	เพื่อประเมินกำลังของลม และการตึงของกล้ามเนื้อ สำหรับใช้ในการวางแผนการรักษา ได้แก่ การตั้งตำรับยา และการนวดรักษา

การวางแผนการฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย

การฟื้นฟูสภาพด้านหัตถเวช (๔)

การตรวจก่อนนวด

๑. ดูท่าเดิน มีลักษณะพิเศษ ขาข้างที่เป็นเดินปิดปลายเท้า มือและแขนหงิกงอ
๒. ดูข้อต่อหัวไหล่ มีหลุดหลวมหรือไม่ มากหรือน้อย โดยใช้นิ้วมือวัดว่ากระดูกต้นแขนต่ำจากหัวศมไหล่กี่นิ้วมือ
๓. ดูลักษณะทั่วไปของแขน ขา
 - กล้ามเนื้อมักลีบ หลังเท้าบวม
 - สีผิว มักมีสีดำ คล้ำ ซีด
 - อุณหภูมิ มือ-เท้าหรือตัว มักเย็น
๔. จับชีพจรมือและเท้า ถ้าเต้นไม่สมดุลกัน (ลมเบื้องสูง ลมเบื้องต่ำ ไม่สมดุลกัน) จะเป็นลมชีวหาสคมร์ มีเสมหะมาก ขาดน้ำ ท้องผูก อุจจาระเหนียว จะต้องนวดท้องเพื่อปรับสมดุล (อัมพาตชนิดอ่อน)

๕. วัดสันเท้า

- ถ้าตรวจพบข้างที่เป็นสั้น เป็นอัมพาตชนิดแข็ง ตอบสนองต่อการนวดช้า
- ถ้าตรวจพบข้างที่เป็นยาว เป็นอัมพาตชนิดอ่อน ตอบสนองต่อการนวดเร็ว

๖. ทดสอบกำลังและการเคลื่อนไหวของขา


- กระดิกนิ้วเท้าขึ้น - ลง อาจทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี
- กระดกข้อเท้าขึ้น - ลง อาจทำไม่ได้หรือทำได้ไม่เต็มที่
- ทดสอบแรงถีบปลายเท้า อาจทำไม่ได้หรือทำได้แบบอ่อนแรง
- ทดสอบกำลังสะโพก ให้ตั้งชันเข้าสองข้าง (ในกรณีผู้ป่วยตั้งชันเข้าได้) โดยตั้งขาดีเป็นหลักก่อนแล้วให้กางเข้า หันเข้า เพื่อทดสอบว่ามีกำลังตอบสนองได้ดีหรือไม่


กรณีผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการตรวจ ให้บีบนิ้วชี้ของเท้าแล้วหักลงเร็ว ๆ ถ้าผู้ป่วยชักขาหนี แสดงว่าเส้นประสาทหลังการได้ จะตอบสนองต่อการนวด สามารถเดินได้ และนวดจุดสัญญาณที่ ๒ ขาด้านนอกได้


๗. ทดสอบกำลัง และการเคลื่อนไหวของแขน

- คอว่า - หงายมือ อาจทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี
- กำ - หยียดมือ อาจทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี
- ทดสอบแรงบีบของมือ ๒ ข้างเปรียบเทียบกับกัน ข้างที่เป็นอ่อนแรงกว่า
- ตั้งข้อศอก อาจทำไม่ได้หรือทำได้แบบไม่มั่นคง
- กระดกข้อมือขึ้น - ลง โดยหอบประคองข้อมือ คนไข้อาจทำไม่ได้หรือทำได้ไม่เต็มที่
- ชูแขนชิดหู หยียดนิ้วมือ ถ้าชูได้เรียกว่าเส้นประสาทสมบูรณ์ตอบสนองการ รักษาดี
- ดึงแขน ๓ จังหวะ อาจทำไม่ได้หรือทำได้แบบอ่อนแรง

แนวทางการรักษาด้วยการนวดไทย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน







สูตรนวดตามแนวทางการรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

(นวดข้างที่เป็นก่อน จึงค่อยนวดข้างที่ไม่เป็น ๑ รอบ)

๑. นวดพื้นฐานขา เน้นข้อเท้า เปิดประตูลม (๑ - ๓ รอบ)
๒. นวดพื้นฐานหลัง (๑ - ๓ รอบ)
๓. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ หลัง (๑ - ๓ รอบ)
๔. นวดพื้นฐานขาด้านนอก (๑ - ๓ รอบ)
๕. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ ขาด้านนอก (๑ - ๓ รอบ) ในกรณีผู้ป่วยเหยียดข้อไม่ได้ ระวังการนวดสัญญาณ ๒ ขาด้านนอก
๖. นวดพื้นฐานขาด้านใน (๑ - ๓ รอบ)
๗. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ ขาด้านใน (๑ - ๓ รอบ)
๘. นวดพื้นฐานท้อง (๑ - ๓ รอบ)
๙. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ ท้อง (๑ รอบ)

หมายเหตุ : ข้อ ๘ - ๙ ห้ามนวดในกรณีมีโรคประจำตัวเป็น AF (Atrial fibrillation), AAA (Abdominal aortic aneurysm) ห้ามนวดท้องเด็ดขาด (โดยการนวดท้องต้องอยู่ภายใต้ผู้มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น)

๑๐. นวดพื้นฐานแขนด้านใน (๑ - ๓ รอบ)
๑๑. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ แขนด้านใน (๑ - ๓ รอบ)
๑๒. นวดพื้นฐานแขนด้านนอก (๑ - ๓ รอบ)
๑๓. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ แขนด้านนอก (๑ - ๓ รอบ)
๑๔. นวดพื้นฐานบ่า (๑ - ๓ รอบ)
๑๕. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ หัวไหล่ (๑ - ๓ รอบ) ในกรณีผู้ป่วยเหยียดข้อแขนไม่ได้ ระวังการนวดสัญญาณ ๒ หัวไหล่

หมายเหตุ : ถ้ามีอาการมึนปากตลก ลิ้นกระด้างแข็ง พูดไม่ชัด ให้นวดข้อ ๑๖ - ๑๙

๑๖. นวดพื้นฐานคางคอก (๑ - ๓ รอบ)
๑๗. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ ศีรษะด้านหลัง (๑ - ๓ รอบ)
๑๘. นวดจุดจอมประสาท (๑ รอบ)
๑๙. นวดสัญญาณ ๑ - ๕ ศีรษะด้านหน้า (๑ - ๓ รอบ)

การตรวจหลังนวด

๑. ดูข้อต่อหัวไหล่ ในกรณีที่ตอบสนองต่อการนวด ข้อไหล่มีความกระชับขึ้น
๒. ดูลักษณะทั่วไปของแขน ขา
 - กล้ามเนื้อ ในกรณีที่บวมลดลง ในกรณีที่ลีบ มีความกระชับขึ้น
 - สีผิว มืดดำ คล้ำ ชีดลดลง
 - อุณหภูมิ อุ่นขึ้น
๓. จับชีพจรมือและเท้าเด่นสมดุลกัน

๔. วัดสันเท้า เท้ากันมากขึ้น

๕. ทดสอบกำลังและการเคลื่อนไหวของขา

- กระดิกนิ้วเท้าขึ้น ลง อาจไม่ตอบสนองหรือ ทำได้มากขึ้น
- กระดกข้อเท้าขึ้น ลง อาจไม่ตอบสนองหรือ ทำได้มากขึ้น
- ทดสอบแรงถีบปลายเท้า อาจไม่ตอบสนองหรือ ทำได้มากขึ้น
- ทดสอบกำลังสะโพก ให้ตั้งชันเข้าสองข้าง (ในกรณีผู้ป่วยตั้งชันเข้าได้) โดยตั้งขาตีเป็นหลัก ก่อนแล้วให้กางเข้า หนีบเข้า เพื่อทดสอบว่ามีกำลังตอบสนองได้ดีหรือไม่

๖. ทดสอบกำลัง และการเคลื่อนไหวของแขน

- คว่ำ – หายมือ อาจทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี
- กำ – หยียดมือ อาจทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี
- ทดสอบแรงบีบของมือ ๒ ข้างเปรียบเทียบกัน ข้างที่เป็นอ่อนแรงกว่า
- ตั้งข้อศอก อาจทำไม่ได้หรือทำได้แบบไม่มั่นคง
- กระดกข้อมือขึ้น – ลง โดยหมอบประคองข้อมือ คนไข้อาจทำไม่ได้หรือทำได้ไม่เต็มที่
- ชูแขนชิดหู หยียดนิ้วมือ ถ้าพูดได้ว่าเส้นประสาทสมบรูณ์ตอบสนองการ รักษาดี
- ดึงแขน ๓ จังหวะ อาจทำไม่ได้หรือทำได้แบบอ่อนแรง

ระยะเวลาการนัดและความถี่

๑. กรณีที่ผู้ป่วยยังไม่ตอบสนองกับการกระตุ้นความรู้สึก ควรนัดฟื้นฟูสภาพวันละ ๑ ครั้งๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที ร่วมกับการประคบสมุนไพร อย่างน้อย ๓๐ นาที ติดต่อกัน ๓ วัน จึงทำการประเมินผล

๒. กรณีผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อความรู้สึก สามารถกระดิกนิ้วมือได้ ควรนัดฟื้นฟูสภาพวันเว้นวันหรือ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที ร่วมกับการประคบสมุนไพรอย่างน้อย ๓๐ นาที จึงทำการประเมินผล

๓. กรณีที่ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเล็กน้อย ควรนัดฟื้นฟูสภาพสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที ร่วมกับการประคบสมุนไพร อย่างน้อย ๓๐ นาที ติดต่อกันประมาณ ๒ เดือน หรือทำการรักษาต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง

คำแนะนำหลังนัด

๑. สอนญาติ เรื่องการนวดผ่อนคลาย ประคบสมุนไพร และกายบริหารเพื่อนำกลับไปดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้าน

๒. งดอาหารแสลงพื้นฐาน เช่น ข้าวเหนียว หน่อไม้ เหล้าเปียร์ เครื่องในสัตว์ ยาแก้ปวด (ยกเว้นกรณี แพทย์สั่ง) เป็นต้น และอาหารที่ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี อาหารรสเย็น เช่น ฟัก แตงโม อาหารที่ส่งเสริม การเกิดโรคประจำตัว เช่น รสหวาน มัน เค็ม

๓. ไม่นอนทับแขน ขา ข้างที่เป็น

๔. พักผ่อนให้เพียงพอ

๕. ส่งเสริมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดหรือหางานอดิเรกทำ เช่น การร้อยลูกปัด ปั่นดินน้ำมัน การฝึกสมาธิ

ข้อควรระวังในการนวด

๑. วัดความดันโลหิตก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
๒. ผู้ป่วยความดันโลหิตมากกว่า ๑๔๐ / ๑๐๐ มิลลิเมตรปรอท **งดเปิดประตูลม**
๓. ผู้ป่วยที่รับยา warfarin ให้ขนาดผ่อนคลาย **งดเปิดประตูลม**
๔. ห้ามทำการดัดข้อต่อ ห้ามดึงหัวไหล่ ห้ามกระตุกหัวเข่าข้างที่เป็นโดยเด็ดขาด
๕. ห้ามนวดในบริเวณข้อต่อหัวไหล่ ข้อสะโพก
๖. การประคบสมุนไพรต้องทดสอบความร้อนก่อนทุกครั้ง ระวังอย่าใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป หรือวางลูกประคบนานเกินไป เพราะอาจเกิดแผลพุพองเนื่องจากผู้ป่วยไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับความร้อนเนื่องจากสูญเสียการรับรู้ความรู้สึก และระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชา
๗. ห้ามนวด ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับลิ้มเลือด และหลอดเลือดดำอักเสบ หรือกรณีที่มีผู้ป่วยที่เคยได้รับการสวนสายยางเพื่อล้างหลอดเลือดที่หัวใจ

ข้อควรระวังตามแนวทางการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด

๑. Hypotone : flaccid : ผู้ป่วยมีสภาวะกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการหลุดของข้อต่อ กล้ามเนื้อหดรั้ง ต้องจัดทำผู้ป่วยให้อยู่ในท่าปกติช่วงนี้สามารถนวดแบบสัมผัส เบา ๆ หรือลูบเบา ๆ ได้ ข้อห้ามในระยษนี้คือ ห้ามออกแรงกดบริเวณข้อต่อ เพราะส่งผลให้ข้อต่อกระดูกมีการเคลื่อนหลุดได้
๒. Hypertone : spasticity : ผู้ป่วยมีสภาวะเกร็งตัวของกล้ามเนื้อผู้ป่วยระยะนี้ห้ามนวดบริเวณรยางค์แขน - ขา แบบกดจุด หรือออกแรงนวดแบบแรง ๆ เด็ดขาดระยะนี้ควรเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อรยางค์แขน - ขา ในท่าตรงกันข้ามกับการเกร็งหากผู้ป่วยมีอาการเกร็งเล็กน้อย สามารถนวดแบบเบา ๆ
๓. Edema : บวมน้ำ : ผู้ป่วยที่มีภาวะบวมน้ำ แนะนำให้จัดทำให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจ แล้วนวดแบบลูบเข้าสู่หัวใจ เพื่อลดอาการบวม
๔. Muscle tightness : ภาวะกล้ามเนื้อหดรั้งผู้ป่วยที่มีการหดรั้งของกล้ามเนื้อควรเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ
๕. Limit ROM : มีการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อในผู้ป่วยที่มีภาวะไหล่ติด ควรเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้สุดช่วงการเคลื่อนไหว ร่วมกับการนวดประคบ เพื่อคลายกล้ามเนื้อรอบ ๆ หัวไหล่
๖. Pain : ปวดกล้ามเนื้อ : ผู้ป่วยบางรายหากมีการหดตัวของกล้ามเนื้อนาน อาจทำให้มีเกิดจุดกดเจ็บบริเวณบ่า คอ หลัง ได้ ในระยะนี้สามารถนวดแบบกดจุดได้รวมกับการประคบ
๗. Sensation : การรับรู้ความรู้สึกหากผู้ป่วยสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกร้อน - เย็น ควรระวังการใช้ความร้อนกับผู้ป่วย ควรตรวจการรับรู้ความรู้สึกของผู้ป่วยก่อนให้การนวดฟื้นฟู

แนะนำยาสมุนไพร (๕)

แบ่งการรักษาออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงปลาย

๑. ช่วงต้น เป็นระยะที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย หรือเคลื่อนไหวได้เพียงเล็กน้อย ในแนวราบ (เทียบระดับ Motor power ๐ - ๒) จะเริ่มต้นรักษาโดยให้ยา “รสสุขุมเย็น” ประมาณ ๒ - ๓ วัน เพราะ ในช่วงแรกผู้ป่วยจะมีภาวะความดันโลหิตสูง การให้ยารสสุขุมเย็น จะเป็นการปรับลมให้การเดินของลมเบา ลง และจะปรับเป็น “ยารสสุขุมร้อน” เมื่อผู้ป่วยสามารถสามารถกระดิกนิ้วมือ นิ้วเท้าได้ กรณีผู้ป่วยมีปัญหาท้องผูกต้องแก้ไขปัญหาท้องผูกก่อน

๒. ช่วงกลาง เป็นระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีพัฒนาการ สามารถกระดิกนิ้วมือ นิ้วเท้าหรือพอที่จะขยับแขนขาได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถต้านแรงได้ (เทียบระดับ Motor power ๒ - ๓) ซึ่งในระยะนี้จะเน้น “ยารสสุขุมร้อน” เป็นหลัก เพื่อช่วยกระตุ้นธาตุไฟ เสริมธาตุไฟและอาจเพิ่มยาบำรุงเส้นตามสภาพผู้ป่วยแต่ละราย

๓. ช่วงปลาย ระยะนี้ผู้ป่วยมีการพัฒนาที่ดีขึ้น สามารถที่จะยืนได้ ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้มากขึ้น เช่น การใส่เสื้อ การแปรงฟัน ล้างหน้า หวีผม พุด - คุย ตอบโต้สื่อสารได้ดีขึ้น หรือในบางรายเริ่มที่จะฝึกเดินสามารถพยุงน้ำหนักตัวเองได้ จะเน้นรักษาด้วย “ยารสร้อน” เพื่อปรับลมและบำรุงธาตุให้บริบูรณ์



ยาสมุนไพรที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อาการ/สรรพคุณ	ยาสมุนไพรที่ใช้	ข้อห้าม/ข้อควรระวัง
๑. ปรับลมให้การเดินของลม เบาลง	ยาจิตรารมณ (ยารสสุขุมเย็น) ขนาดรับประทาน ๑๒๐ ซีซี. ก่อนอาหาร ๓ เวลา เช้า – กลางวัน – เย็น	ข้อห้าม - ข้อควรระวัง -
	ยาหอมเทพจิตร (ยารสสุขุมเย็น) รับประทานครั้งละ ๑ – ๑.๔ กรัม เมื่อมีอาการ ทุก ๓ – ๔ ชั่วโมง ไม่ควรเกิน วันละ ๓ ครั้ง	ข้อห้าม - ข้อควรระวัง: ๑. ควรระวังใช้ร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือด เป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัว ของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ๒. ควรระวังใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบวมและเกิด พิษได้ ๓. ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้
๒. ปรับลม กระตุ้นธาตุไฟ เสริมธาตุไฟ	ยาหอมนวโกฐ (ยารสสุขุมร้อน) รับประทานครั้งละ ๑ – ๒ กรัม ทุก ๓ – ๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการไม่ควรเกิน วันละ ๓ ครั้ง	ข้อห้าม : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่ใช้ ข้อควรระวัง : ๑. ควรระวังใช้ร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือด เป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัว ของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ๒. ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้
๓. ปรับลม บำรุงธาตุ ให้บริบูรณ์	ยาต้มแก้ลมอัมพฤกษ์ (ยารสร้อน) รับประทาน ๑๒๐ ซีซี. ก่อนอาหาร ๓ เวลา เช้า – กลางวัน – เย็น	ข้อห้าม : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้และ เด็กเล็ก ข้อควรระวัง : ควรระวังใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของ การบวมและเกิดพิษได้
๔. ปวดตามร่างกาย	ยาเถาวัลย์เปรียง หรือ ยาเถาวัลย์ เปรียง ร่วมกับยาสหัสธารา รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารทันที	ข้อห้าม : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ข้อควรระวัง : ๑. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก เนื่องจากเถาวัลย์เปรียงออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ๒. อาจทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดิน อาหาร

๕. ท้องผูก	ยาธรณีสังฆฆาต ขนาดรับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน	ข้อห้าม : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้และเด็กเล็ก ข้อควรระวัง : ๑. ควรระวังการใช้ร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ๒. ควรระวังใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร์และเกิดพิษได้ ๓. ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin , porparanolol , theophylline , และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง ๔. ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ
	ชาขงชุมเห็ดเทศ รับประทานครั้งละ ๓ – ๖ กรัม ขงน้ำร้อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน	ข้อห้าม : ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ ข้อควรระวัง : ๑. ควรระวังการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease ๒. การรับประทานยาในขนาดสูงอาจทำให้เกิดไตอักเสบ ๓. ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสีย น้ำและเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และทำให้ลำไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย ๔. ควรระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
๖. ความดันโลหิตสูงร่วมกับอาการ ปัสสาวะขัดมีตะกอนในรายที่ใส่สายสวนปัสสาวะ	ชาขงกระเจี๊ยบแดง รับประทาน ครั้งละ ๒ – ๓ กรัม ขงน้ำร้อน ๑๒๐ – ๒๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	ข้อห้าม : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ข้อควรระวัง : กระเจี๊ยบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบาย

๗. กระจายลม แก้อาการชาปลายมือ กระตุ่นธาตุไฟ	สหัสธารา (ยารสร้อน) รับประทานครั้งละ ๑ – ๑.๕ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	ข้อห้าม : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้ ข้อควรระวัง : ๑. ระวังการใช้ ในผู้ป่วยที่ใช้ยา warfarin ร่วมด้วย ๒. ควรบริโภคในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย เพปติก และกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน ๓. ควรระวังใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ ๔. ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin , porparanolol , theophylline , และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
๘. บำรุงธาตุ ปรับธาตุ กระตุ่นให้อยากอาหาร	เบญจกุล (ยารสร้อน) รับประทานครั้งละ ๘๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	ข้อห้าม : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้และเด็กเล็ก ข้อควรระวัง : ๑. ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน จะส่งผลให้ธาตุไฟกำเริบ ๒. ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน ๗ วัน ๓. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ใช้ยา warfarin ร่วมด้วย
	ยาบำรุงโลหิต รับประทานครั้งละ ๑ กรัม วันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร	ข้อห้าม : ห้ามใช้ใน หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้ ข้อควรระวัง : ๑. ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ๒. ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

คำแนะนำการฝึกปฏิบัติตัว (๖)

๑. ฝึกออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะแขน – ขาข้างที่อ่อนแรง ตามท่าการบริหารของ หัตถเวชกรรมไทย โดยการชักออก การบริหาร ร่างกายอย่างสม่ำเสมอและสนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือด้วย
๒. งดอาหารแสลง / อาหารรสจัดต่าง ๆ เช่น เผ็ด เค็ม หวาน มัน เปรี้ยว ของหมักดอง อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ แอลกอฮอล์ บุหรี่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
๓. ดื่มน้ำวันละ ๘ – ๑๐ แก้ว เพื่อป้องกันท้องผูกกรณีมีอาการท้องผูก แนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ หรือน้ำมะขามเปียกเพื่อช่วยในการระบายท้อง
๔. ไม่ควรนอนดึก หรือทำงานเกินกำลัง
๕. ทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือการทำสมาธิ
๖. หางานอดิเรกทำเพื่อคลายเหงา เช่นการอ่านหนังสือ การร้องเพลง

การประเมินผลหลังการฟื้นฟูสภาพ (๗)

๑. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ตามแบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Barthel Index)
 ๒. ประเมิน Motor power ตามแบบประเมิน Motor power ในผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง
 ๓. แบบสำรวจความพึงพอใจ
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประเภทที่ ๒ ประเมินผลสัปดาห์ที่ ๑ และสัปดาห์ที่ ๔ หรือประเมินทุกสัปดาห์เพื่อดูสถานะของผู้ป่วย
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประเภทที่ ๓ ประเมินผลสัปดาห์ที่ ๑ และสัปดาห์ที่ ๘ หรือประเมินทุกสัปดาห์เพื่อดูสถานะของผู้ป่วย

การวางแผนจำหน่าย (๘)

๑. ให้คำแนะนำการดูแลต่อเนื่องกับญาติและทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน
๒. จำหน่าย/นัดหมายติดตามเยี่ยมบ้านครั้งต่อไป
๓. ส่งข้อมูลการจำหน่ายให้ศูนย์ COC : Continuity Of Care

การประเมินประสิทธิผลระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของทีมหมอครอบครัวระดับปฐมภูมิ
เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย

๑. ประเมิน ADL ดีขึ้นอย่างน้อย ๑ ระดับ ร้อยละ ๘๐
๒. ประเมิน Motor Power ดีขึ้นอย่างน้อย ๑ ระดับ ร้อยละ ๘๐

เอกสารอ้างอิง

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ๒๕๕๕. คู่มือการใช้ยา

จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร. คู่มือการนวดแบบราชสำนัก. มปป.

เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว. ๒๕๕๖. แนวทางเวชปฏิบัติโรค
หลอดเลือดสมอง. สระแก้ว. ข.ดำรงชัยการพิมพ์.

บุษบา ประภาสพงศ์และคนอื่น ๆ. ๒๕๕๔. พระคัมภีร์ขวदार ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ภูมิปัญญาทาง
การแพทย์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ ๔) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.

มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม. ๒๕๔๘. หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก). บริษัทพิณเนศ
พรินท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด. นายไพโรจน์ สายหุ้ม.

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ๒๕๕๔. แนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์
แผนไทย ๑.

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๔.
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดแผนไทยสำหรับแพทย์.

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๐.
แนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. โรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๓.
ตำราผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๐. แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๒๕๕๘. แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยา
ต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน. สืบค้นจาก

http://www.thaiheart.org/images/column_๑๒๙๒๑๕๔๑๘๓/warfarin_Guideline

(๑). pdf

สุรเกียรติ์ อาชานุภาพ. ๒๕๕๔. ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป ๑. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

อภิชาติ ลิ้มติยะโยธินและคณะ. คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก ภาคเทคนิคการนวดรักษาอาการ
โรคที่พบบ่อย. มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา.



ภาคผนวก


การจำแนกประเภทผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วไปที่ต้องดูแลต่อเนื่อง

ประเภทของผู้ป่วยที่เยี่ยมบ้าน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

ผู้ป่วยประเภทที่ ๑ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่เริ่มเจ็บป่วยระยะแรก มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเล็กน้อย ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือการเกิดภาวะโรคร่วม ยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาวะของโรค

ผู้ป่วยประเภทที่ ๒ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่มีการดำเนินของโรคส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติ มีความจำกัด / ไร้ความสามารถเล็กน้อย ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เต็มที่ ต้องการผู้ดูแลในการทำกิจวัตรประจำวัน

ผู้ป่วยประเภทที่ ๓ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของโรค ทำให้เกิดความพิการ / จำกัดความสามารถในการทำกิจกรรมของตนเองหรือมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการดำรงชีวิต มีความจำเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือการทำกิจวัตรประจำวันได้




แบบบันทึกประวัติ ปัญหา การวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษา ผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน

ชื่อ.....สกุล..... เพศ () ชาย () หญิง อายุ.....ปี HN.....
 AN.....วันเดือนปีเกิด.....วันที่เข้ารับการรักษา (แผนไทย).....วันที่ Admit.....
 วันที่เริ่มหัดการ.....สัญญาณชีพ ความดันโลหิต.....mmHg. ชีพจร.....ครั้ง/นาที การหายใจ.....ครั้ง/นาที อุณหภูมิ องศาเซลเซียส
 อาการสำคัญ.....
 อาการปัจจุบัน

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต.....

การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน.....

ปัญหาที่พบจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายการวิเคราะห์ธาตุ 	เป้าหมายในการรักษา(ระบุ)
วิเคราะห์ทางการแพทย์แผนไทย ธาตุเจ้าเรือนตามบุคลิกภาพ..... ธาตุเจ้าเรือนตามวัน/เดือนปีเกิด	แนวทางการรักษา การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย () นวดไทย แนวการนวด..... จุดเน้น..... ข้อห้าม/ข้อควรระวังการนวด () ประคบสมุนไพร () อบสมุนไพร () การรักษาด้วยยาสมุนไพร
การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย	ICD 10 U.

ข้อควรระวังในการรักษา

H.N.....

[illegible]

แบบประเมินการติดตามการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

ชื่อ	นามสกุล	อายุ.....ปี	H.N.....
	ครั้งที่ประเมิน		
	1	2	3
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน(ระบุ)			
ADL			
Motor Power			
สัญญาณชีพ			
- ความดันโลหิต.....mmHg.			
- ชีพจร.....ครั้ง/นาที			
- การหายใจ.....ครั้ง/นาที			
- อุณหภูมิ องศาเซลเซียส			
- จุดเจ็บ ระบุตำแหน่ง.....			
- Pain score (0 - 10)			
การหลุดหลวมข้อต่อ (cm.).....			
คุณลักษณะทั่วไป (ระบุรายละเอียด)			
1. กล้ามเนื้อ (การสลับ/ฝ่อ/ความเกร็ง)			
2. การบวม			
3. กำเดา (ความร้อน)			
4. ลักษณะการเดิน			
5. การพูด (ชัด / ไม่ชัด)			
จับการเต้นของชีพจรมือและเท้า (ข้างที่เป็น)			
วัดเส้นเท้า (ระบุเป็นเซนติเมตร)			
องศาการเคลื่อนไหวของข้อ			
1. กระดกข้อเท้า			
2. กระดกนิ้วเท้า			
3. ตั้งขาขึ้นเข่า			
4. กระดกข้อมือ			
5. กระดกนิ้วมือ			
6. การกำมือ แบมือ			
7. คว่ำมือ – หายมือ			
8. ตั้งข้อศอก			
9. ขูแขนขึ้นเหนือศีรษะ			
กำลังกล้ามเนื้อ			
1. ทดสอบแรงบีบมือ			
2. ทดสอบแรงถีบเท้า			
3. ดึงแขน-เท้าแขน 3 จังหวะ			
4. ทดสอบกำลังสะโพก			
การตรวจร่างกายอื่น ๆ			
ผู้ประเมิน			
หมายเหตุ ให้ผู้ประเมินเติมหมายเลขลงในช่องการติดตามอาการในข้อกำหนดดังนี้ (หรือกรณีหากผู้ประเมินต้องการเขียนรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถบันทึกลงในช่องว่างได้)			
หมายเลข 0 หมายถึง ไม่สามารถทำได้			
หมายเลข 1 หมายถึง ทำได้เล็กน้อย / ทำได้แต่ไม่ได้งศา			
หมายเลข 2 หมายถึง ทำได้ปกติ / ได้งศา			

ชื่อสกุล..... อายุ ปี HN.....
วันที่เริ่มเหตุการณ์.....
ผู้ส่ง
วัตถุประสงค์การปรึกษา.....
ผู้รับ

[illegible]

หมายเหตุ ๐ ในเดือนที่ทำการรักษาทั้ง ๖ เดือนที่รักษาต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ระบุวันและเดือน ในช่องวันที่รับการรักษา

สาเหตุที่สิ้นสุดการรักษา

() หาย () ดิ้น

() คงเดิม

() ส่งต่อการแพทย์อื่น เหตุผล...

ปัญหาที่เหลืออยู่ (เมื่อสิ้นสุดการรักษา)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(.....)

คำอธิบายแบบบันทึก

คำอธิบาย แบบบันทึกประวัติ ปัญหา การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ เป็นแบบบันทึกประวัติแรกเริ่ม ให้ผู้บันทึกบันทึกอาการและปัญหาที่พบจากการตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ สมภูมิต่างกันการเกิดโรคด้านการแพทย์แผนไทย การวินิจฉัยโรคด้านการแพทย์แผนไทย

♦ ปัญหาที่พบ ให้บันทึกปัญหาที่พบจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และปัญหาจากการวิเคราะห์ธาตุสมภูมิต่างกัน

♦ เป้าหมายการรักษา ให้ผู้ทำการตรวจด้านการแพทย์แผนไทย เขียนระบุ ในการรักษาผู้ป่วยครั้งนี้ ต้องการรักษา อาการใดเฉพาะ เช่น

- ✿ ลดอาการปวด บริเวณ แขน ขา กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย
- ✿ บรรเทาอาการชา
- ✿ เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อบริเวณ.....เป็นต้น

♦ แนวทางการรักษา ประกอบด้วย การนวดไทย และการประคบสมุนไพรทั่วร่างกาย หากมีจุดเน้น ข้อห้าม ข้อควรระวัง ให้ระบุในแบบบันทึก ให้ครบถ้วน

♦ การรักษาด้วย ยาสมุนไพร ระบุตำรับ ชื่อยา วิธีการใช้ยา เฉพาะราย

♦ การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย (ตามรหัส ICD ๑๐ U) ให้ระบุ เช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตทั้งตัว เป็นต้น

ส่วนที่ ๒ แบบบันทึกการรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วยตลอดเลืดสมอง (แบบบันทึกรายวัน) ให้ผู้บันทึกเขียนให้ครอบคลุม โดย

- ✿ ระบุวัน เดือน ปี ที่ผู้ป่วยมาทำการรักษาในทุกครั้ง
- ✿ ช่องการรักษา ให้เขียนบันทึก ว่าให้การรักษาด้วยวิธีใดบ้าง เช่น การนวด-การประคบทั่วร่างกาย หรือการใช้ยาสมุนไพร
- ✿ ประเมินผลการรักษา หลังการรักษา
- ✿ ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน (แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
- ✿ หมายเหตุ ระบุอาการผิดปกติที่พบ หรือการเปลี่ยนแปลงต่อการทำการรักษาในครั้งนั้น

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินการติดตามการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

ให้ผู้ประเมิน เขียนรายละเอียด ที่ได้จากการตรวจร่างกาย ลงในช่องว่าง ตามลำดับครั้งที่ประเมินในแบบบันทึก ประกอบด้วย

- ✿ ครั้งที่ประเมิน (ลำดับที่ ๑ คือแรกเริ่ม - ครั้งที่ ๘) ให้ผู้บันทึก ใส่วัน-เดือน-ปี ที่ประเมินในช่องว่างได้ครั้งที่ประเมิน
- ✿ บันทึกผลการประเมิน ที่ได้จากการตรวจร่างกายผู้ป่วยในครั้งนั้น ๆ โดยประกอบด้วย ADL , Motor Power สัญญาณชีพ จุดกดเจ็บ และระดับอาการที่ปวด (Pain score) ระดับ ๐ - ๑๐

กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดกล้ามเนื้อ จะทำการวัด Pain score

Pain score (เครื่องมือที่ใช้วัดความปวด) คือ การบอกความรู้สึกเป็นตัวเลข เป็นการประเมินความปวดด้วยตัวเลขโดยผู้ตรวจ โดยต้องอธิบายกับผู้ป่วยว่า ถ้าไม่ปวดเลยแทนด้วยเลข ๐ และ ปวดรุนแรงมาก แทนด้วยเลข ๑๐

ให้ผู้ป่วยเลือกว่าปวดตอนนี้อยู่ที่เลขใด ให้ผู้ตรวจทำเครื่องหมายบนเส้นตรงที่มีตัวเลขแทนค่าความรุนแรงของความปวดโดยปลายข้างหนึ่งแทนค่าด้วยเลข ๐ หมายถึง ไม่ปวดปลายอีกข้างแทนค่าด้วยเลข ๑๐ หมายถึง ปวดรุนแรงมากที่สุด ผู้ป่วยทำเครื่องหมายตรงเลขใดถือเป็นคะแนนความปวด

๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
ไม่ปวด										ปวดรุนแรงมากที่สุด

การหลุดหลวมของข้อต่อ ถ้ามีให้ระบุ

☼ ดูลักษณะทั่วไป (ให้เขียนระบุรายละเอียด)

☼ ระบุการเดินของชีพจร ผลที่ได้จากการวัดสันเท้า เทียบ ๒ ข้าง และองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่าง ๆ

☼ ทดสอบกำลังกล้ามเนื้อ และการตรวจร่างกายอื่นๆเพิ่มเติมอื่นที่มีผลต่อการรักษา

☼ ลงชื่อผู้ประเมิน

ส่วนที่ ๔ แบบสรุปการให้ หัตถการ (ทั้งหมด ตลอดการรักษา)

คำอธิบาย เป็นแบบบันทึก การรักษาของผู้ป่วย ทั้งหมด ใน ๑ ราย ตั้งแต่แรกเริ่ม การเข้ารับการรักษาจนสิ้นสุดการรักษา

☼ การบันทึก ให้ผู้บันทึกใส่เครื่องหมาย ○ วงกลม ล้อมรอบเดือนที่ผู้ป่วยมาทำการรักษา หากมารักษาเป็นห้วงเวลา รวมหลายเดือนติดต่อกัน ให้ผู้บันทึกวงกลมล้อมรอบให้ครบทุกช่วงเดือน พร้อมระบุ วันที่ เดือน ในช่องด้านล่าง

☼ ระบุสาเหตุการสิ้นสุดการรักษา

☼ ปัญหาที่เหลืออยู่ เมื่อสิ้นสุดการรักษา ให้ผู้ประเมินเขียน ระบุ พร้อมทั้งลงชื่อผู้ประเมิน

แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Barthel Index)

กิจกรรม / คะแนน	ครั้งที่ 1 วันที่ 0	ครั้งที่ 2 สัปดาห์ 1	ครั้งที่ 3 สัปดาห์ 4 หรือ 8	ครั้งที่ 4 6 เดือน
1. Feeding (การรับประทานอาหารเมื่อเตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า) 0 = ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ต้องมีคนป้อนให้ 5 = ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้หรือตักให้เป็นชิ้นเล็กๆไว้ล่วงหน้า 10 = ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ				
2. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอี้) 0 = ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยกันยกขึ้น 5 = ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรง หรือมีทักษะ 1 คน หรือใช้คนทั่วไป 2 คน พยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได้ 10 = ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทำตามหรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแลความปลอดภัย 15 = ทำเองได้				
3. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด) 0 = ต้องการความช่วยเหลือ 5 = ทำเองได้ (รวมทั้งที่ทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)				
4. Toilet Use 0 = ช่วยตัวเองไม่ได้ 5 = ทำเองได้บ้าง (อย่างน้อยทำความสะอาดตัวเองได้หลังเสร็จธุระ) แต่ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง 10 = ช่วยเหลือตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมได้เอง ทำความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระแล้วใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย)				
5. Bathing (การอาบน้ำ) 0 = ต้องมีคนช่วยเหลือหรือทำให้ 5 = อาบน้ำได้เอง				
6. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน) 0 = เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ 5 = ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง(ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และเข้ามุมห้องหรือประตูได้				

กิจกรรม / คะแนน	ครั้งที่ 1 วันที่ 0	ครั้งที่ 2 สัปดาห์ 1	ครั้งที่ 3 สัปดาห์ 4 หรือ 8	ครั้งที่ 4 6 เดือน
10 = เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ทำตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย				
15 = เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง				
7. Stairs (การขึ้นลงบันได 1 ชั้น)				
0 = ไม่สามารถทำได้				
5 = ต้องการคนช่วยเหลือ				
10 = ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น cane จะต้องเอา ขึ้นลงได้)				
8. Dressing (การสวมใส่เสื้อผ้า)				
0 = ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองไม่ได้เลยหรือได้น้อย				
5 = ช่วยตัวเองได้ราวร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย				
10 = ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิป หรือใส่เสื้อผ้าที่ ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้)				
9. Bowels (การกลั่นอุจจาระ)				
0 = กลั่นไม่ได้ หรือต้องการสวนอุจจาระอยู่เสมอ				
5 = กลั่นไม่ได้เป็นบางครั้ง (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์)				
10 = กลั่นได้เป็นปกติ				
10. Bladder (การกลั่นปัสสาวะ)				
0 = กลั่นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้				
5 = กลั่นไม่ได้เป็นบางครั้ง (เป็นน้อยกว่า วันละ 1 ครั้ง)				
10 = กลั่นได้เป็นปกติ				
รวมคะแนน				
ชื่อผู้ประเมิน				
ตำแหน่ง				

การแปลผล

0-20	หมายถึง	ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เลย
25-45	หมายถึง	สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เล็กน้อย
50-70	หมายถึง	สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ปานกลาง
75-95	หมายถึง	สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้มาก
100	หมายถึง	สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองทั้งหมด

แบบประเมิน Motor power ในผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง

แบบประเมิน Motor power ในผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง									
ส่วนที่ประเมิน	เกรด(Grade)								หมายเหตุ
	วันที่ 0		สัปดาห์ที่ 1		สัปดาห์ที่ 4 หรือ 8		ติดตามครบ 6 เดือน		
	ขวา	ซ้าย	ขวา	ซ้าย	ขวา	ซ้าย	ขวา	ซ้าย	
แขน									
ขา									
ลายมือชื่อผู้ตรวจ									
วันเดือนปี ที่ประเมิน									
-เกรด/ระดับ 0 = กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต/แขนหรือขาไม่มีการเคลื่อนไหวเลย -เกรด/ระดับ 1 = กล้ามเนื้อไม่มีแรงหดตัวแต่ยกกล้ามเนื้อหดตัวได้ /มีการเคลื่อนไหวปลายนิ้วมือ-เท้าได้เล็กน้อย -เกรด/ระดับ 2 = กล้ามเนื้อมีแรงที่จะเคลื่อนไหวแนวราบกับพื้น -เกรด/ระดับ 3 = แขนหรือขาสามารถยกได้ แต่ต้านแรงที่กดไว้ไม่ได้ -เกรด/ระดับ 4 = แขนหรือขาสามารถยกได้ แต่ต้านแรงที่กดได้น้อยกว่าปกติ -เกรด/ระดับ 5 = แขนหรือขามีกำลังปกติในการตรวจจะทำการตรวจทั้ง 4 รยางค์									

ระดับ INR ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

Indication	INR
Prophylaxis of venous thrombosis (high - risk surgery)	2.0 – 3.0
Treatment of venous thrombosis	2.0 – 3.0
Treatment of pulmonary embolism	2.0 – 3.0
Prevention of systemic embolism	2.0 – 3.0
Tissue heart valves	2.0 – 3.0
Mechanical prosthetic heart valves	2.0 – 3.0
Acute myocardial infarction (to prevent systemic embolism)	2.0 – 3.0
Valvular heart disease	2.0 – 3.0
Atrial fibrillation	2.0 – 3.0
Mechanical prosthetic valves (high risk)	2.5 – 3.5

รหัสวินิจฉัยโรค รหัสหัตถการ (ในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) ด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสวินิจฉัย	U61.10 อัมพาตครึ่งซีก U61.12 อัมพาตทั้งตัว
รหัสวินิจฉัย (รวม)	การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค U 77

รหัส หัตถการ (บริการที่ให้)

รหัส	ความหมาย
9007811	การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ทั่วร่างกาย
9007820	การประคบด้วยสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย
9007904	การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการรับประทานอาหารสุขภาพ
9007902	การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน

รายนามผู้จัดทำ

แพทย์หญิงอรรตน์ จันทร์เพ็ญ
นางสาวนุชลดา ไรจนประภาพรรณ

นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
นางวัฒนาวรรณ วรรณไกรโรจน์

นายภาณุ ศรีวรรัตน์
นางพิมพ์วรรณ ศิริจิระชัย
นางสาวประกายรุ่ง ทองเงิน
นางชินนันทน์ บุญสนอง
นางสุขสบาย ฉะอ้อนตะคุ
นายประยุตต์ ปิติวรยุทธ

นางชวนพิศ พรพรหมโชติ
นางสาววาสนา สุขไพศาล
นางสาวอุมาภรณ์ เรืองภักดี
นางจิรัชยา ประมวล
นางสาวนุชรี บวงสรวง
นางสาวสุชีรา อนุศาสนรักษ์
นางสาวกรรณา เจริญนวัฒน์
นางสาวนวลฉวี สุทธิโณม
นายสมบัติ อินทเกษร
นางกานต์ชนก ทรงพระ
นางสาวยุพิน แก้วกอเกตุ
นางสาวกนกทิพย์ หังสสุต
นายรณยุทธ สองทุ่ง
นางสาวโสภภาพรรณ บุญภูมิ
นางสาวศรีประไพ ศรีวิเศษ
นายพัฒนพงษ์ ชะนา
นางสาวปวิษฐา สุบิน
นางสาวจุลิศร ชมรมรัมย์
นางสาววรรณดา คำเกลี้ยง
นางสาวสุกญา สุขหลาย
นางสาวณัฐรินทร์ ศรีนัครเศ
นางกนกวรรณ เสนน้อย
นายอาทิตย์ พานิช

นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลระยอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลระยอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.บ่อไร่ จังหวัดตราด
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดตราด
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดปราจีนบุรี
แพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
แพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี



คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในชุมชน
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

